ANALYSE POLLINIQUE DES MIELS										
Aspect	Echantillon	Arba-I2	Arba-PB	Arba-I1	Arba-B	Arb-PRIN	Jal-Vill	Jal-Méaud	Chabert	Seraf-Sas
Liquide/cristal.	L/C	S/L	L	S/C	S/C	L	L	S/L	C	L
Teinte	1 à 5	2	1	2,5	2,5	1	2	1,5	3	1
Quantité	1 à 5	2,5	2	4	2	3,5	4	2,5	5	2
Débris végét.	1 à 5	1,5	2	4	2	1	4	5	2	2
Pollen dominant		Sainf.	Acac.	TFL(M)	Lavande	Acac.	TFL(M)	TFL(M)	TFL(M)	Till.
Famille	Plante									
aquifoliacée	houx					.	.			.
boraginacée	myosotis									
campanulacée	campanule gantelée									
composée	aster			.					.	
	centaurée cyanus		oo						oo	
	centaurée jacée		o						oo	
	chardon	.	.				.	.		
	chicorée intybe			.						
	pissenlit		.			.			.	
	raiponce					.	.			
	tournesol									
caprifoliacée	viorne mancienne									
conifère	pin ou sapin	.		.		.	.	.	.	
crucifère	moutarde ou colza								oo	
cupulifère	chataignier			.						o
dipsacacée	knautia									
	scabieuse succise									
éricacée	bruyère rhodod.	.		o	o	.				
géraniacée	géranium des prés						oo	o		
graminée	maïs	.							..	
labiacée	grande astrance				Lav+					
	sauge	.		.	o				.	
légumineuse	gesse			o		o			.	
	lotier									
	mélilot									
	robinier		oo			oo/+	oo	oo	o	oo
	sainfoin	oo/+		oo/+		o	.			
	trèfle blanc	o		o			oo	oo		
	vesce									
malvacée	mauve/guimauve	.				.	.			
oléacée	troëne			.		.	.		oo	
ombellifère	angélique/carotte	o		.		o	.	o	.	
	berce commune									
	grande astrance									
onagrariée	épilobe						o			
plantaginacée	plantain									
polygonacée	rumex			.				.		
rosacée	ronce/framboisier		o			o				
	prunus/pyrus					oo			o	
	aubépine/épine bl.		o			o	o	o		
tiliacée	tilleul	.	.	o		o	o	oo	.	oo/+
miellat	spores	.	o	o				.	.	
Observations		scab.suc	onopord.	scab.	hièble.	ail.	noisetier	noisetier	beaucoup	très
(Origine)		if.		if.		scab.	tref.viol	scab.	pollens	propre
		trefl.viol	peu			noisetier	bourdaine			
(Altitude)			pollen			suie.	dard abeille			
Légende										
ER :éricacée (bruyère, rhodo. etc)		NOTES. Analyse qualitative et quantitative approchée. Le spectre pollinique indiqué est représentatif d'au moins 75% des pollens. Une bonne analyse n'est obtenue qu'avec un échantillon soigneusement prélevé.								
TFL(M):toutes fleurs montagne		Fait à Saint Ismier le 25.09.1998								
+ : Pollen dominant		J.Huberson Apiculteur. Tél. 04.76.52.43.66.								
o : Pollen en petite quantité										
oo: Pollen en quantité appréciable										
. : Pollen présent mais rare										